

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM MOVIPREP - badanie do godz.12:00

Na badanie należy przybyć z osobą towarzyszącą, w dniu badania nie wolno prowadzić samochodu.

TRZECI I DRUGI DZIEŃ PRZED BADANIEM

Dieta lekkostrawna – mięso drobiowe, gotowane, bez skóry; klarowne zupy; biały chleb bez masła; przecedzony rosół; klarowne soki; woda mineralna; kawa bez śmietanki i mleka; chude wędliny; ziemniaki.

Zakazane – ziarna; kasze; ryż; makarony; owoce pestkowe (winogron, pomidory, kiwi, truskawki); nasiona siemienia lnianego, maku i sezamu.

DZIEŃ PRZED BADANIEM

Do godziny 18:00- kisiel owocowy bez owoców, czysty rosół, gorzka herbata, kawa bez mleka i cukru, woda do woli.

Przyjęcie preparatu MOVIPREP

- ✓ Opakowanie zawiera po dwie saszetki A i B
- ✓ Wieczorem, w dniu poprzedzającym badanie, do załączonego pojemnika wsyp zawartość jednej torebki A i jednej torebki B.
- ✓ Dolej wodę do pojemnika do poziomu górnej kreski (1 l). Wymieszaj całość aż płyn będzie prawie całkowicie przejrzysty – może to potrwać kilka minut. Przed wypiciem możesz schłodzić roztwór.
- ✓ Wypij roztwór w tempie 1 szklanka co 10-15 minut.
- ✓ Ważne! Dodatkowo wypij 2 szklanki wody (łącznie 0,5 l) w czasie 30 minut.

W DNIU BADANIA - Przyjmujemy leki nasercowe, na nadciśnienie i na prostatę – popijamy 2 łyżkami wody. Pozostałe leki przyjmujemy po badaniu.

Przyjęcie preparatu MOVIPREP

- ✓ Powtórz wszystkie powyższe czynności dla drugiej dawki leku zaczynając picie roztworu na 4 godz. przed planowaną godziną kolonoskopii.
- ✓ Od zakończenia przyjmowania drugiej dawki leku do rozpoczęcia badania powinna minąć co najmniej godzina.
- ✓ Możesz pić dowolną ilość klarownych płynów np. wodę, herbatę do 2 godz. przed wyznaczoną godziną badania.
- ✓ W czasie przygotowywania do kolonoskopii wystąpią liczne wypróżnienia (biegunka), pod koniec samą treścią płynną (woda).

PO BADANIU

Zalecana dieta lekkostrawna, w przypadku wzdęć i bólu brzucha – ESPUMISAN, NO-SPA